

Rubus subangulosus (Sudre) Prain 1905

Ronce subanguleuse

Série Sylvatici

François Vernier francois.vernier@etik.com

Résumé : *Rubus subangulosus* est une ronce rare et la découverte d'une nouvelle localité ouvre des perspectives permettant de supposer une plus grande extension de cette belle espèce. La fiche descriptive permettra à chacun, en complément de la clé de détermination Alsace-Lorraine (Vernier F., Royer J.M. Weiss J.M., 2025), de déterminer plus sûrement ce taxon.

Mots-clés : *Rubus*, batologie, Lorraine, Région Grand Est

Abstract: *Rubus subangulosus* is a rare bramble, and the discovery of a new locality opens up possibilities suggesting a wider distribution of this beautiful species. The descriptive sheet will enable everyone, in addition to the Alsace-Lorraine identification key (Vernier F., Royer J.M., Weiss J.M., 2025), to more reliably identify this taxon.

Keywords: *Rubus*, batology, Lorraine, Grand Est Region

Zusammenfassung: *Rubus subangulosus* ist eine seltene Brombeerart, und die Entdeckung eines neuen Fundorts eröffnet Möglichkeiten, die auf eine weitere Verbreitung dieser schönen Art hindeuten. Das Beschreibungsblatt ermöglicht es jedem, zusätzlich zum Bestimmungsschlüssel für Elsass-Lothringen (Vernier F., Royer J.M., Weiss J.M., 2025), diesen Taxon zuverlässiger zu identifizieren.

Schlüsselwörter: *Rubus*, Batologie, Lothringen, Region Grand Est

Introduction : *Rubus subangulosus* est décrite dans la 6ème partie des Ronces vosgiennes (Boulay -1869), sous le nom illégitime de *R. latifolius* Boulay 1869. Il avait été retrouvé en 2018 dans le massif forestier du Kemberg près de Saint-Dié-des-Vosges (88), lors d'une prospection à laquelle ont pris part, Jean-Marie Weiss, Jean-Marie Royer, Jean-Louis Sogorb et moi-même. En préparant la session *Rubus* Floraine/Société Botanique d'Alsace, je l'ai découvert à Celles-sur-plaine, en assez grande quantité, le long d'une petite route longeant la rivière la Plaine. Cette nouvelle localité se trouve à une bonne vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau de celle de Saint-Dié.

Taxinomie et synonymie :

En l'absence de cette espèce dans TaxRef18 nous prendrons comme référence le tableau *Rubus92morpho* (Mercier D. *et al.*, 2022)

Synonyme : *Rubus latifolius* Boulay, nom. illeg.

Description :

Plante rampante.

Turion : nettement anguleux à faces planes, peu velu, sans glandes stipitées, 0-2 microaiguillons/5 cm.

Aiguillons : 5-10/5 cm, 5-7 mm de long, presque égaux, droits à un peu inclinés à base dilatée d'environ 4 mm, presque coniques, vulnérants.

Feuilles : longues de 17,5 à 28 cm, 5 folioles digitées à pédalées sur 1 mm.

Face supérieure : faiblement poilue (0-5 poils/cm²) à glabrescente.

Face inférieure : verte, brièvement à peu poilue.

Pétiole : plan au-dessus, garni de 8-14 aiguillons droits pour les latéraux et falciformes pour les postérieurs, longueur 42-71 % de la foliole terminale.

Stipules : linéaires un peu lancéolés.

Foliole terminale : orbiculaire, longueur du pétiole 30-39 % du limbe, rapport largeur sur longueur du limbe 77-95 %.

Apex : 15 mm, finement acuminée.

Base : faiblement cordée.

Dentelure : doublement dentée, à dents ovales étroites, profondeur 3-5 mm.

Folioles latérales : pétioles 20-25 mm.

Folioles basales : pétioles 4-7 mm.

Inflorescence : ordinairement arquée, un peu penchée, oblongue, arrondie au sommet, nettement au-dessus des feuilles, parfois la totalité de la partie florale démunie de feuilles.

Rachis : flexueux, allongé, obtusément anguleux, velu, sans glandes stipitées, aiguillons inégaux, droits à très légèrement falciformes.

Pédicelles : 4-12 mm de long, pubescents tomenteux, glandes stipitées rares plus courtes que le diamètre du pédicelle, aiguillons inexistant à très rares.

Sépales : réfléchis, blancs, tomenteux, finement et à peine glanduleux, présence d'acicules, appendice de 0,5-1,5 mm de long.

Pétales : blancs, ciliés au sommet, ovales, brusquement onguiculés, concaves.

Étamines : dépassant les styles, filets blancs.

Styles : rosés à la base.

Carpelles : munis de quelques poils au sommet.

Risques de confusion : aucun.

Répartition : Région de Saint-Dié-des-Vosges et de Celles-sur-Plaine. À rechercher dans les vallées du Rabodeau, de la Ravine et dans celles du nord du Massif vosgien.

Habitat : lieux ombragés sur grès vosgien.

Bibliographie

Boulay N.-J., 1869. - Ronces vosgiennes (partie 6). 120-121.

Ferrez Y. & Royer J.-M., 2021. Le genre Rubus dans le nord-est de la France. SBFC, CBNFC-ORI, GREFFE, 362 p.

Mercier D. (eds), Chagneau D., Duboc P. et Vernier F., 2022. - Tableau comparatif des Rubus d'Europe, version 92. - Site internet Tela Botanica, Atelier Rubus, CC-BY-SA.

Vernier F., Royer J.M., Weiss J.M., 2025 - Le genre Rubus en Alsace-Lorraine – Revue botanique du Grand Est 2021-1



Feuille du turion © F. VERNIER



Floricanne © F. VERNIER